

۱۶ - کدامیک از موارد زیر از تشخیص‌های پرستاری در بیمار مبتلا به پنومونی است؟

- الف) خطر کمبوود دریافت پروتئین به علت مشکلات گوارشی
- ب) خطر نقصان در حجم مایعات به علت تب و افزایش تعداد تنفس
- ج) خطر عفونت سیستمیک به علت ضعف سیستم ایمنی
- د) خطر کاهش سطح هوشیاری و غش به علت کاهش قند خون

۱۷ - مددجویی که مبتلابه مشکلات پوستی است، کدامیک از موارد زیر برای استحمام او صحیح است؟

- الف) استفاده از یک صابون ملایم بدون چربی
- ب) مرطوب نگهدارشتن دائمی محل ابتلا
- ج) استفاده از عوامل چربی زدا برای نرم کردن ضایعه
- د) خشک کردن محل ضایعات با حرکات دووار حوله

۱۸ - توصیه پرستاری برای پیشگیری از وقوع سوختگی کدام است؟

- الف) عدم استفاده از اتوهای بخاری
- ب) تنظیم درجه آب گرمکن و کتری برقی بین ۱۵۰-۱۲۰ درجه فارنهایت
- ج) جداسازی وسایل برقی غیر ضروری از برق در هنگام خروج از منزل
- د) خاموش سازی روغن شعله ور شده به کمک آب سرد

۱۹ - کدام مورد زیر خطر مرگ و میر سوختگی را در سالمندان افزایش می‌دهد؟

- الف) افزایش مشکلات بینایی و شنوایی
- ب) کاهش حسنهای پوستی
- ج) کاهش عملکردهای ریوی
- د) کاهش توان حرکتی

۲۰ - زمان مناسب برای ارزیابی مجدد وسعت سوختگی کدام است؟

- الف) ۷۲ ساعت پس از پذیرش در بیمارستان
- ب) ۴۸ ساعت پس از پذیرش در بیمارستان
- ج) هشت ساعت پس از پذیرش در بیمارستان
- د) پس از بستری شدن در بخش اختصاصی سوختگی

۲۱ - اولین اولویت در مراقبت از فردی که دچار سوختگی شدید شده کدام است؟

- الف) شروع مایع درمانی      ب) پانسمان سوختگی      ج) درمان عفونت
- د) بررسی و حفظ راه هوایی

۲۲ - در بیمار مبتلا به سوختگی درجه دو با وسعت ۲۵ درصد، مورد صحیح کدام است؟

- الف) کاهش بروندۀ قلب، ثانویه به کاهش حجم خون
- ب) نمایان شدن مشکلات ریوی، معمولاً بصورت دیررس
- ج) افزایش حرکات دستگاه گوارش و بروز استفراغ
- د) فقدان علائم سیستمیک بطور معمول در سوختگیهای ۲۵ درصد

- ۲۳ - بیمار مبتلا به گلوکوم، در بخش بستری و تحت درمان دارویی قرار گرفته است. پزشک برای وی قطره هماتروپین هر ۴ ساعت، و قرص استازولامید تجویز نموده است. وظیفه پرستار در مراقبت از این بیمار کدام است؟
- (الف) دادن قطره هماتروپین به منظور گشاد نمودن مردمک، طبق دستور
  - (ب) آموزش به بیمار درباره نحوه استفاده از داروهای فوق
  - (ج) درخواست از پزشک برای بازنگری برنامه درمانی
  - (د) بررسی مکرر بیمار از نظر احتمال افزایش وزن بخاطر مصرف استازولامید
- ۲۴ - آقایی، به علت تاری پیشرونده بینایی، و ضرورت اصلاح کاتاراکت، تحت جراحی قرار گرفته و برای وی IOL استفاده شده است. ۱۲ ساعت پس از جراحی، و بستری شدن در بخش، بیمار دچار ادم شدید قرنیه و درد چشم شده است. پرستار باید پزشک را از نظر احتمال بروز کدام عارضه زیر مطلع سازد؟
- (الف) عفونت قرنیه
  - (ب) اندوفتالمیت
  - (ج) سندروم سمتی بخش قدامی
  - (د) خونریزی داخل چشمی
- ۲۵ - پس از جراحی ماستوئیدکتومی و تمپانوپلاستی، آموزش صحیح کدام است؟
- (الف) احتمال احساس دردهای متناوب و تیز در گوش، ۲-۳ هفته بعد از عمل
  - (ب) خود داری از بلند کردن اجسام سنگین و زور زدن تا ۲ ماه بعد از عمل
  - (ج) گزارش فوری هرگونه احساس خشکی دهان و اختلال در حس چشایی به پزشک
  - (د) گزارش هرگونه کاهش شنوایی در روزهای اولیه پس از عمل به پزشک
- ۲۶ - آموزش مناسب به بیمار مبتلا به هیدروپس آندولنف کدام است؟
- (الف) کاهش مصرف مایعات
  - (ب) مصرف غذاهای حاوی نمک
  - (ج) استفاده از میان وعده ها
  - (د) مصرف قهوه هنگام سرگیجه
- ۲۷ - در آزمون وبر، گزینه صحیح کدام است؟
- (الف) شنیدن بهتر صدای توسط گوش سالمتر
  - (ب) مشکل انتقال صوت در گوش مبتلا به شنوایی کمتر
  - (ج) مشکل انتقال صوت در گوش با شنوایی بهتر
  - (د) مشکل عصبی در گوش با شنوایی بهتر
- ۲۸ - در صورت داشتن NGT متصل به ساکشن، برای پیشگیری از هیپوناترمی، کدام اقدام ضروریست؟
- (الف) ثابت نگهداشتن سطح سدیم خون کمتر از ۱۲۵ mEq/L
  - (ب) کنترل استفراغ بیمار با دادن داروهای ضد تهوع
  - (ج) برقراری خط وریدی با سرم قندی ۰.۵٪
  - (د) شستشوی لوله معده با محلول ایزوتونیک سالین

۲۹ - ضروریست برای کنترل فلیبیت ناشی از تزریق پتاسیم وریدی، از سر سوزن نازک استفاده شود. مکانیسم اثر این اقدام کدام مورد است؟

- الف) کنترل درد ناشی از ماده تزریقی
- ب) به حداقل رسانیدن جریان خون در اطراف سر سوزن
- ج) عدم نیاز به تزریقات مکرر ناشی از خرابی رگ
- د) امکان استفاده از رگهای باریک در بیمار

۳۰ - بیماری در بخش ارولوژی بدليل ناووسایی مزمن کلیه و علایم تهوع، بی اشتهايی و استفراغ بستری شده است. هدف اصلی پرستار در مراقبت از بیمار کدام مورد است؟

- الف) تعادل آب و الکتروولیت ها، رژیم غذایی کم پروتئین با سدیم بالا و پتاسیم کم
- ب) کاهش تهوع و استفراغ و برقراری تعادل مایعات و الکتروولیتها
- ج) رژیم غذایی با پروتئین محدود و ارزش بالا، پرکالری، سدیم و پتاسیم کم
- د) کاهش تهوع، رژیم غذایی کم کالری با سدیم و پتاسیم بالا

۳۱ - در بیماری که تحت دیالیز صفاچی قرار دارد علایم پریتونیت مشاهده شده است. چه علائمی تایید کننده بروز این عارضه است؟

- الف) افزایش فشار خون، تهوع، استفراغ و شوک
- ب) درناز مایع خونی، افزایش فشار خون و درد شدید شکم
- ج) تب، عفونت، درناز مایع کدر
- د) درناز مایع کدر، درد منتصر شکمی و حساسیت برگشتی، کاهش فشار خون

۳۲ - هدف ورزش عضلات لگن (PME) از جمله ورزش Kegel در بیماران مبتلا به بی کنترلی ادرار کدام است؟

- الف) تقویت عضلات مثانه در زنان و پیشگیری از عفونت ادراری
- ب) تقویت عضلات ادراری لگن و افزایش قدرت کنترل ادرار و مدفوع در زنان و مردان
- ج) سفت شدگی عضلات ارادی روده در زنان و کمک به کنترل دفع
- د) کمک به بیماران دچار CVA جهت تقویت عضلات دستها و پاها

۳۳ - علایم و اقدامات پرستاری مرتبط با پبلو نفریت حاد کدام است؟

- الف) درد ناحیه کلیه، تب - محدود سازی مصرف مایعات
- ب) الیگوری، درد زیر شکم - محدودیت مصرف مایعات
- ج) تب، لکوسیتوز، وجود باکتری در ادرار، تهوع و استفراغ - پایش میزان مایعات دریافتی
- د) لکوبنی، کاهش درجه حرارت و میزان دفع ادرار - دادن مایعات زیاد به بیمار

۳۴ - کدامیک از موارد زیر در مراقبت پس از بیوبسی کبد صحیح است؟

- الف) خوابانیدن بیمار به سمت چپ و کنترل علایم حیاتی هر ۱۵ دقیقه
- ب) خوابانیدن بیمار به سمت راست و آموزش بیمار جهت جلوگیری از سرفه و عطسه
- ج) جلوگیری از بلند کردن اجسام سنگین به مدت یکماه و کنترل علایم حیاتی تا ۲۴ ساعت اول
- د) قرار دادن بیمار در حالت خوابیده به پشت و بی حرکت کردن او به مدت ۲۴ ساعت

۳۵ - کدامیک از علایم ذیل نشانه های کتو اسیدوز دیابتی (DKA) است؟

- الف) دردهای شکمی، تهوع و استفراغ، هایپرونوتیلاسیون و تنفس با بوی میوه
- ب) کاهش قند خون، هایپرونوتیلاسیون و تنفس با بوی سیب گندیده
- ج) هایپر گلیسمیا، هایپرونوتیلاسیون و دردهای شکمی
- د) کوما، هایپرونوتیلاسیون، هایپر گلیسمیا